

P'tit Kayo*

à l'école



Nom :

Prénom :

Nom du centre :

Téléphone :



P'TIT KAYO à l'école

*Une maladie
hémorragique
ne s'attrape pas
au contact
du sang*

*Un hémophile
ne se vide pas
de son sang en cas
de saignement*



Qu'est-ce qu'une maladie hémorragique ?

C'est un trouble de la coagulation dû à l'absence ou à l'insuffisance de fabrication d'un facteur de la coagulation et/ou des plaquettes.

Ce déficit empêche la formation d'un caillot sanguin solide et prolonge le saignement en cas de blessures, traumatismes...

L'enfant ne saigne pas plus, mais plus longtemps

L'hémophilie, la maladie de Willebrand, l'afibrinogénémie, les déficits en facteur VII, XIII, les troubles plaquettaires... sont des maladies hémorragiques héréditaires, c'est-à-dire transmises par le père et/ou la mère. Elles peuvent également, dans de rares cas, être spontanées.

P'TIT KAYO

à l'école



Plus le saignement est pris en charge rapidement plus la récupération sera rapide et évitera ainsi les complications

Que faire en cas d'accident hémorragique ?

- ▶ **Ne pas paniquer**
- ▶ **Rassurer** l'enfant, et l'installer confortablement
- ▶ **Evaluer** l'importance de l'accident hémorragique
- ▶ **Ecouter et/ou observer l'enfant** à la recherche d'une position antalgique, d'une perte de mobilité, d'un changement de comportement, d'une perte de connaissance...
- ▶ **Signaler/transmettre aux parents**, même en cas d'accident minime.
- ▶ **Se référer au PAI*** élaboré en début d'année scolaire par le médecin scolaire en collaboration avec le médecin spécialisé qui suit l'enfant, et l'équipe enseignante.
- ▶ **Utiliser la trousse d'urgence** fournie pas les parents pour prodiguer les 1^{ers} soins (désinfection, compression, application de froid, médicaments...).

Le médecin scolaire et les parents peuvent vous demander d'avoir une dose du facteur de coagulation de leur enfant (conservée au frigo).
Pensez à contrôler régulièrement la date de péremption des traitements. Ce sont les secours ou les parents formés qui peuvent réaliser l'injection.
Il n'est pas de la responsabilité de l'infirmière scolaire ou de l'enseignant de faire l'injection.

P'TIT KAYO

à l'école

Les enfants peuvent masquer ou minimiser un saignement de peur d'être exclus d'une activité ou de se faire disputer

Les enfants peuvent se servir de leur maladie comme excuse pour ne pas participer à une activité



Quelle place a l'enfant avec un trouble de la coagulation dans le groupe :

- ▶ **Ne pas le surprotéger**
- ▶ **Ne pas l'isoler** : il peut comme tous les autres enfants aller en récréation, manger à la cantine et participer aux sorties scolaires, sous réserve de prendre les précautions nécessaires.
- ▶ La pratique des **activités sportives** est autorisée et fortement recommandée, sous réserve de prendre les précautions nécessaires (si contre-indication le médecin du CRC-MHC fera une dispense).
- ▶ Le **port de protections** est conseillé pour le vélo, la trottinette, la draisienne...
- ▶ **Voyages scolaires** : il n'y a pas de contre-indication mais prévoyez l'organisation avec les parents.

SAIGNEMENTS

1^{ÈRE} INTENTION

SAIGNEMENTS DE NEZ

- 1 Le faire asseoir
- 2 Le faire moucher
- 3 Lui demander de garder la tête droite
- 4 Comprimer fortement avec le pouce à la base de la narine pendant 10 min

SAIGNEMENTS DE LA BOUCHE

Le saignement peut paraître impressionnant car le sang est dilué avec la salive

- 1 Faire rincer la bouche à l'eau froide
- 2 Comprimer si la plaie est visible avec une compresse pendant 10 min
- 3 Faire sucer des glaçons

PLAIES

- 1 Désinfecter les plaies avec un antiseptique

- 2 Comprimer pendant 10 min

- 3 Mettre un pansement

« LES BLEUS » LES BOSSES

Mettre de la glace/du froid pendant 10 minutes minimum

Voir la conduite à tenir dans le PAI

SI BESOIN

Si les symptômes persistent contacter les parents

**HÉMATOMES
HÉMARTHROSES**

**TRAUMATISMES
CRÂNIENS LÉGERS**

**TRAUMATISMES
ABDOMINAUX**

Prévenir les parents

limiter la mobilisation - Mettre l'enfant au repos

Immobiliser le membre
ou la zone douloureuse

Evaluer la conscience

Etre à l'écoute
des douleurs/plaintes

Mettre de la glace

Surveiller l'évolution

Surveiller étroitement l'évolution afin
de déceler tout signe de traumatisme crânien
grave (aphasie, nausée...)

Surveiller l'évolution

Voir conduite à tenir dans le PAI

**Si aggravation de l'état général
Appeler le SAMU : 15**

SAIGNEMENTS